



تاریخ ابلاغ: آبان ۱۴۰۳

آمادگی تصویربرداری از کلیه و مجاری اداری با ماده حاجب :

- نصب آنژیوکت جهت تزریق دارو
- بیمار باردار نباشد.
- شب قبل در ساعت ۱۸ سوپ سبک میل کنید و سپس ملین روغن کرچک و دایمتیکون را طبق دستور پزشک مصرف نمایید.
- ملین (روغن کرچک و دایمتیکون) از شب قبل جهت تخلیه روده ها مصرف شود.
- تا ساعت ۲۴ آب و مایعات (مایعات گرم) فراوان نوشیده شود (به جز شیر و نوشابه).
- به مدت ۶ تا ۸ ساعت ناشتا باشید.
- آزمایش CR BUN- به همراه داشته باشید.
- بیماری دیابت و تیروئید نداشته باشید
- به ماده حاجب حساسیت نداشته باشید.
- داروهای خود را طبق برنامه مصرف کنید؛ البته به جز متفورمین و ایندرال (قطع این داروها از ۴۸ ساعت قبل از انجام آزمون الزامی است و مصرف دوباره قرص متفورمین به شرط عملکرد طبیعی کلیه ها پس از انجام آزمون با تزریق ماده حاجب بلامانع است) (مصرف مجدد قرص ایندرال بعد از آزمون آزاد است).
- توجه به این نکته ضروری است در صورتی که درخواست اورژانس گرافی های فوق الذکر باشد نیاز به دادن آمادگی به بیمار نیست.

عکسبرداری جهت بررسی برگشت ادرار از مثانه به حالب:

- سوند ادراری نصب می شود.
- بیمار باردار نباشد.
- مدارک قبلی پزشکی خود را به همراه داشته باشید.
- لباس ساده و راحت بدون زیپ و گیره و... بپوشید.
- نیاز به آمادگی روده ای و ناشتایی نیست.