



تاریخ ابلاغ: آبان ۱۴۰۳

سونوگرافی داپلر عروق:

این سونوگرافی، جریان خون غیرطبیعی درون رگ های بدن را بررسی می کند. از این روش برای بررسی و تشخیص و تنگی های عروقی، جداسازی تومورهای بدخیم از خوش خیم، توده های کم خون از پر خون، انسداد گرفتگی عروقی اندام در افراد سیگاری و ... استفاده می شود.

آمادگی های پیش از سونوگرافی داپلر:

- حداقل ۲ ساعت قبل از انجام سونوگرافی داپلر، فرد باید از مصرف هرگونه مواد نیکوتین دار مانند سیگار، تنباکو و قلیان خودداری نماید زیرا سبب انقباض رگ های خونی شده و نتایج غلطی را ایجاد می کند.
- مراجعین محترم جهت انجام سونوگرافی داپلر حتی المقدور، هرگونه مواد فلزی و جواهر آلات را به همراه نداشته باشند، زیرا این وسایل در امواج سونوگرافی داپلر اختلال ایجاد می کنند .
- هنگام سونوگرافی داپلر، فرد باید تنفس خود را به حالت طبیعی انجام دهد و از هرگونه موقعیت غیرطبیعی باید پرهیز شود تا سرعت جریان خون درون رگ ها، در حالت طبیعی بدن اندازه گیری شود.
- با تجویز پزشک در سونوگرافی های داپلر عروق شکمی عدم مصرف غذاهای نفاخ حداقل روز قبل از آزمون و مصرف قرص های دایمتیکون به صورت هر ۶ ساعت ۱ عدد یا بیشتر طبق تجویز پزشک معالج جهت کاهش گازهای روده ای و روغن کرچک در صورت عدم تحمل، جایگزینی با قرص های بیزاکودیل به صورت هر ۶ ساعت ۱ عدد توصیه می شود.