



خون مخفی در مدفوع

گاهی اوقات خونریزی های مختصری در بخش های مختلف دستگاه گوارش اتفاق می افتد که به علت کم بودن با چشم دیده نمی شود . بنابراین باید با روش های آزمایشگاهی تشخیص داده شود .

بهتر است این آزمایش در ۳ نوبت انجام شود.
برای انجام این آزمایش باید نکات زیر را رعایت نمائید:

- ۴۸ تا ۷۲ ساعت پیش از آزمایش و در طی دوره جمع آوری نمونه مدفوع از خوردن گوشت قرمز ؛ گوشت سفید ، مرغ و ماهی ، شلغم و تربچه خودداری کنید.
- مصرف قرص های آهن و اسیدفولیک ، کپسول همتینیک و ففول ، ایندومتاسین ، کلشی سین ، اسپیرین ، بروفن ، کورتون ها و ویتامین C باید ۴۸ ساعت پیش از انجام آزمایش قطع شود.
- در صورت داشتن سابقه خونریزی از لثه ۴۸ ساعت پیش از انجام آزمایش از مسواک زدن و کشیدن نخ دندان اجتناب نمائید.
- نمونه باید سریعاً به آزمایشگاه تحویل داده شود.
- نمونه مدفوع نباید با ادرار یا سایر مواد آلوده شود.