



آزمایشات: FBS.TG.BUN.CR.H PYLORI AB.URIC ACID.CPK T

آزمایش قند خون ناشتا را پس از ۸ ساعت ناشتایی انجام دهید (توجه داشته باشید که این مدت ناشتایی باید در طی شب باشد).

آزمایش تری گلیسیرید (یکی از چربی های خون) حداقل نیاز به ۱۲ ساعت ناشتایی دارد.

برای انجام آزمایش نیتروژن و اوره خون ۸-۴ ساعت ناشتایی کافی است ؛
بعلاوه بیمار باید حداقل در طی ۳-۲ روز پیش از انجام آزمایش از مصرف غذاهای حاوی گوشت زیاد خودداری نماید .

انجام آزمایش اسید اوریک و اوره خون نیاز به حداقل ۸ ساعت ناشتایی دارد.

آزمون تعیین پادتن ضد میکروب هلیکوباکتر نیاز به آمادگی خاصی ندارد
اما بهتر است که بیمار شب قبل غذای چرب مصرف نکند زیرا افزایش چربی خون می تواند نتیجه این آزمایش را مخدوش نماید .

CPK T حداقل تا ۱ هفته قبل از انجام تست هیچ گونه تزریق داخل عضلانی نداشته باشد.