



تاریخ ابلاغ: آبان ۱۴۰۳

## رادیوگرافی

رادیولوژی معمولی یا پرتونگاری ساده اولین گام تشخیصی برای بیشتر بیماریهاست. رادیوگرافی معمولی تصاویر دو بعدی از راه ثبت اختلاف جذب اشعه ایکس توسط بافتهای مختلف تهیه میشود. رادیوگرافی که با استفاده از ماده حاجب انجام شود به رادیوگرافی رنگی معروف است.

### گرافی ساده شکم (KUB)

پرتونگاری از شکم در مواردی مانند انسداد، آپاندیسیت، سندرم نفروتیک، تصادف، بلع اجسام خارجی، انواژیناسیون - پیچ خوردگی روده و غیره انجام می شود، آزمایش بدون هیچ آمادگی قبلی انجام می شود. پرتونگاری در مورد بررسی سنگ کلیه، بیمار از شب ناشتا و روغن کرچک و قرص دایمیتیکون مصرف نماید.

### اروگرافی (IVP)

روش رادیولوژی تشخیصی است که دستگاه ادراری بعد از تزریق ماده حاجب بهتر نمایان میشود. در این روش برای نشان دادن طرز کار لگنچه ها و حالب ها از ماده حاجب استفاده میشود که از طریق داخل وریدی به بیمار تزریق میشود.

### آمادگی پیش از انجام گرافی IVP

- ۱- حدود ساعت ۷:۳۰ شب قبل از انجام رادیوگرافی، شام سبکی (سوپ رقیق شده) میل کنید.
  - ۲- یک عددشیشه روغن کامل کرچک حدود ۷۰ میلی گرم میل نمایید.
  - ۳- آب و مایعات (ترجیحا مایعات گرم) فراوان نوشیده شود. (به جز شیر و نوشابه)
  - ۴- هنگام مراجعه به بخش تصویربرداری ناشتا باشید.
  - ۵- در صورت لزوم از قرص های بیزاکودیل و دایمیتیکون طبق دستور پزشک استفاده نمایید.
  - ۶- توجه به این نکته ضروری است در صورتی که درخواست اورژانس گرافی های فوق الذکر باشد، نیاز به دادن آمادگی به بیمار نیست.
- داروهای خود را طبق برنامه همیشگیتان مصرف کنید البته به جز متفورمین و ایندرال که قطع این داروها از ۴۸ ساعت قبل از انجام آزمون الزامی است و مصرف دوباره قرص متفورمین به شرط عملکرد طبیعی کلیه ها پس از انجام آزمون با تزریق ماده حاجب بلامانع است. مصرف مجدد قرص ایندرال بعد از آزمون آزاد است.